

University of Groningen

## Een catamnestic onderzoek van 100 neurotische patienten

Giel, Robert

**IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from it. Please check the document version below.**

*Document Version*

Publisher's PDF, also known as Version of record

*Publication date:*

1965

[Link to publication in University of Groningen/UMCG research database](#)

*Citation for published version (APA):*

Giel, R. (1965). *Een catamnestic onderzoek van 100 neurotische patienten*. [, Rijksuniversiteit Groningen]. [S.n.].

### Copyright

Other than for strictly personal use, it is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s) and/or copyright holder(s), unless the work is under an open content license (like Creative Commons).

The publication may also be distributed here under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the "Taverne" license. More information can be found on the University of Groningen website: <https://www.rug.nl/library/open-access/self-archiving-pure/taverne-amendment>.

### Take-down policy

If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately and investigate your claim.

Downloaded from the University of Groningen/UMCG research database (Pure): <http://www.rug.nl/research/portal>. For technical reasons the number of authors shown on this cover page is limited to 10 maximum.

## STELLINGEN

### I

Bij obductie wegens een cerebro-vasculair accident behoren de extra-craniële arteriae carotides en vertebrales eveneens te worden geschouwd.

### II

Bij tumoren met een hoge graad van maligniteit, voorkomend in het gebied van mond en hals, moet een electieve radicale dissectie van de hals ernstig worden overwogen.

### III

Klinische en plastisch-chirurgische behandeling van tropische ulcera heeft weinig zin zonder verandering van de levensomstandigheden waaronder zij ontstonden.

### IV

Er bestaat een uitsluitend of vrijwel uitsluitend musculaire vorm van de ziekte van Besnier-Boeck.

### V

Voor de interpretatie van de arm-tong tijd is standaardisatie van temperatuur en houding van de patient noodzakelijk.

### VI

De opvatting dat de partiële  $O_2$  -spanning van de inademiningslucht de belangrijkste factor is bij het ontstaan van een barotrauma van het middenoor (Aschan 1947) behoeft correctie.

### VII

Eén van de verwekkers van het *ulcus tropicum* is een mycobacterium.



#### VIII

De paroxysmale positie-duizelingen tijdens en na een ligkuur, zijn door hun onbekendheid bij de arts een aanleiding tot onnodige verlenging van invaliditeit.

#### IX

De uit centraal-statistische gegevens blijkende toename van het aantal sterfgevallen ten gevolge van een subarachnoïdale bloeding berust vooral op een veranderende diagnostiek.

#### X

Myoclonieën en epilepsie bij spuiters van de malaria-bestrijdingsdiensten kunnen berusten op intoxicatie met insecticiden.

#### XI

Buitenechtelijke graviditeit bij vrouwelijke studenten is vooral te verwachten bij die categorie, waarbij psychische stoornissen zijn opgemerkt.

#### XII

Een verband tussen het type van een psychosomatose en de persoonlijkheidsstructuur van de onderzoeker lijkt voorlopig waarschijnlijker dan tussen dat type en de persoonlijkheidsstructuur van de patient.

#### XIII

Bij onze activiteiten in de ontwikkelingsgebieden is de tijdrovende opleiding van de plaatselijke bevolking belangrijker dan het streven naar een snel succes als de uitroeiing van een endemische ziekte.

Stellingen behorende bij R. Giel,  
Een catamnestic onderzoek van 100 neurotische patiënten,  
Groningen 1965